

Oncovet C - Ciclofosfamida - Chemovet - CANINOS

Tipo de cáncer	Tipo de tratamiento (adyuvancia/inducción)	Dosis y esquema de tratamiento	Bibliografía
Anemia hemolítica inmunomediada	Tratamiento de inducción y mantenimiento	50 mg/m ² oral 1 vez por día durante 4 días por semana, durante 4 semanas	Burgess et al, 2000; Mason et al, 2003; Plumb, 2010
Artritis reumatoidea	Tratamiento de inducción y mantenimiento	1 vez x día, 4 días consecutivos cada semana, a una dosis de 2,5 mg/kg si pesa menos de 10kg; 2 mg/kg si pesa 10-30kg y 1,5 mg/kg si pesa más de 35kg	Plumb, 2010
Carcinoma de sacos anales	Tratamiento de inducción y adyuvancia	Diferentes esquemas.	Bennett y col., 2002
Carcinoma de vejiga y uretrales	Tratamiento de inducción y adyuvancia	Diferentes esquemas.	Norris y col., 1992
Hemangiosarcoma	Tratamiento de Adyuvancia	50-75 mg/m ²	Sorenmo et al, 1993

Hemangiosarcoma	Metronomica en adyuvancia	9,3 to 16 mg/m ² cada 24 hs	Wendelburg y col., 2015
Inmunosupresor alternativo para la glomerulonefritis	Tratamiento de inducción y mantenimiento	2,2 mg/kg/24 horas durante 4 días, suspender tres días y luego repetir.	Plumb, 2010
Linfoma multicentrico	Tratamiento induccion	75 mg/m ² VO, 4 dosis con intervalo de 21 días	Marconato y col., 2008
Linfoma renal	Tratamiento de Adyuvancia	225 mg/m ² IV, 3 dosis con intervalo de 21 días	Batchelor et al, 2006
Linfoma multicéntrico	Tratamiento de inducción	250 mg/m ² IV y 250 mg/m ² oral, dosis única	Warry et al, 2011
Linfoma multicéntrico	Tratamiento de inducción y Adyuvancia	200 mg/m ² IV	Keller et al, 1993
Linfoma multicéntrico	Tratamiento de inducción y Adyuvancia	200 mg/m ² oral, durante 15 semanas	Burton et al, 2012
Linfoma multicéntrico	Tratamiento de inducción	50 mg/m ² vía oral durante 4 días, 2 semanas, con intervalos de 15 días. Hasta completar 20 semanas	Sorenmo et al, 2010
Mastocitoma	Tratamiento de inducción y mantenimiento;	50 mg/m ² , día 1,3,6 y 9 IV, 42 mg/m ² , día 13 y 14 vía oral 83 mg/m ² , día 11, 16 y 18 vía oral	Naganobu et al, 2000

	quimioterapia metronomica		
Meningoencefalitis	Tratamiento de inducción y mantenimiento	Diferentes esquemas	Coates y Jeffery, 2014
Penfigo	Tratamiento de inducción y mantenimiento	1,5 mg/kg cada 48 hs	Rosenkrant, 2004
Osteosarcoma	Metronomica	15 mg/m ² , día, por 94 días promedio (extremos 7 y 586 días de tratamiento).	Matsuyama y col, 2018
Poliartritis	Tratamiento de inducción y mantenimiento	1mg/kg oral 1 vez por día durante 4 días y suspender durante 3 días	Plumb, 2010
Sarcomas de tejidos blandos	Quimioterapia metronomica	15 mg/m ² , diariamente hasta los 28 días	Burton et al, 2011
Sarcomas de tejidos blandos	Quimioterapia metronomica	10 mg/m ² , diariamente durante tres meses	Elmslie et al, 2008
Trombocitopenia inmunomediada	Tratamiento de inducción y mantenimiento	50 mg/m ² oral 1 vez por día durante 3-4 días por semana	Young, 1998; Jans et al; 1990

FUENTE: Laboratorio Chemovet S.A. - TE: +54 - 011 - 4220 - 3594 - 9 de Julio 3875 - Lanús - Buenos Aires - Argentina - www.chemovet.com.ar